

Pasningsvejledning for Bambusicola slægten

1. Fugleart

Bambusicola fytchii
Bambusicola thoracica

Burmabambushøne
Kinesisk Bambushøne

2. Fuldvoksen størrelse:

Bambushøns er som vor hjemlige Agerhøne rund og buttet ca.32 cm med en kort hale. Kan minde om en overgang mellem fasan og vagtel i type. Kinesisk Bambushøns er lidt mindre ca.30 cm og mere spinkel bygget.

3. Forventet levealder:

Under gode forhold 10-12 år.

4. Anbefalet størrelse og indretning af anlæg eller bur:

Bør holdes i udendørs voliere min. 3x2m i grundflade og med en højde på 2 m. Volieren skal opbygges så der er læ fra siderne, gerne i form af beplantning med buske. Volieren bør være overdækket med klare plastikplader på den inderste halvdel og her anvendes sand som bundlag, den anden halvdel er kun med trådnæt og herunder er bunddækket græs. I et hjørne af volieren laves redeskjul af gran/fyrregrene, et lille grantræ(80 cm) stilles med toppen i jorden som center for redeskjulet og uden på det lægges grene så der dannes en hule. I den bageste overdækkede del af volieren opsættes en kraftig naturgren (ø 5 cm) som fuglene vil bruge som sovepind. Sovepinden anbringes i ca. 1,5 m højde.

5. Særlige pasningsbehov, herunder særlige krav til temperaturforhold:

Både Burma Bambushøne og Kinesisk Bambushøne er robuste fugle, som kan holdes udendørs hele året, når der blot er tørt (overdækning) læ fra siderne. Om vinteren kan man med fordel ligge omvendte grangrene i bunden i redeskjulet, det giver god isolering når de ofte om vinteren foretrækker overnatning på bund.

6. Stimulering og behov for motion:

Begge arter har normalt en rolig adfærd hvor de går rundt og roder i bundlaget, tager flittigt sandbad i det tørre sand under overdækningen. Afpillet ukrudt fra haven og græs fra græsklipningen tager de meget gerne og kan bruge lang tid på at rode rundt med det.

7. Fodring:

Tropeblanding og parakitblanding til mindre parakitter, grov universal, æggefoder. Animalsk foder i form af små regnorme, melorme og lign.. Overskåne æbler/pærer/appelsin og alle slags bær og druer tager de også gerne. Har behov for grønt hver dag i form af græs eller ukrudt.

8. Sociale behov:

Holdes bedst parvis året rundt. Er fredelig over for andre fugle i volieren.

9. Formering og yngelpleje:

Hønen skraber en fordybning i bunden af redeskjulet og lægger her 6 cremehvide æg, rugetiden er 21 dage. Kun hønen ruger, men når hun forlader reden holder hanen vagt ved reden til hun igen dækker æggene. Når æg er klækket er det både høne og hane der fører kyllingerne, ofte deles de mellem dem både dag og nat.

Kyllingerne varmes af forældrene den første tid, så vær opmærksom på, at kyllingerne kan komme op til sovepinden, da forældrene søger der op efter 3-4 dage efter klækningen. Kyllingerne overnatter også på sovegrenen under forældrene og derfor er et adgangsbræt som kyllingerne kan komme op af nødvendig.

10. Typiske tegn på sygdom og nedsat trivsel:

Oppustet fjerdragt og utilpashed. Spidsbrystet og smuds ved kloaken.

Øvrige informationer:

Høne og hane er næsten ens i tegninger og farver, hanen har kraftige sporer som er et sikkert kønstegn. Hanen har et kraftigt kald som lyder næsten som en tyveri-sirene.

Udseende: Se billeder.



< Burma
Bambushøns

Med kyllinger >



< Kinesisk Bambushøne >



Udbredelse:

Burma bambushøne findes i Bangladesh, Kina, Indien, Laos, Myanmar, Thailand og Vietnam. Kinesisk bambushøne findes i det østlige Kina, Himalaya, Taiwan og indført til Japan.

Lovgivning og dokumentation

Disse vagtler er ikke omfattet af krav om CITES certifikat. Opdrættede fugle kan handles frit inden for EU.

Slutblok

Denne pasningsvejledning er for hold af fugle som familie- eller hobbydyr. Disse fugle kan eventuelt holdes forsvarligt på andre måder end beskrevet i denne vejledning.

Denne pasningsvejledning er lavet af Ingolf Bjørk Andersen, Landsorganisationen Danske Fugleforeninger (ldf-net.dk) med støtte fra Dyrevelfærdspuljen, 2014.

