

Pasningsvejledning for medlemmer af *Perdica* slægten

1. Fugleart

Perdica argoondah

Ørkenbuskvagtel (hed førhen Madrasvagtel)

Perdica asiatica

Buskvagtel (hed førhen Frankolinvagtel)

2. Fuldvoksen størrelse:

Ca. 16 cm lidt større end Kinesisk dværgvagtel, men typemæssigt som en kompakt Kinesisk dværgvagtel.

3. Forventet levealder:

6 – 8 år under beskyttede forhold.

4. Anbefalet størrelse og indretning af anlæg eller bur:

Bør altid holdes i voliere med en højde på 2 m, ved lavere højde min. 1 m skal der opsættes blødt afværge-net under taget, så de ikke skades ved lodret opflyvning. Grundfladen bør min. B.1mXl.2 m. Sand i halvdelen og fugtige blade/skovbund i den øvrige del. Træstub (ca. 30 cm høj) som bruges til vagt- og sangplads placeres midt i volieren, en sådan plads bør der være såvel inden- som udendørs.

Ved hold i udendørs voliere skal der være adgang til tørt inderrum min. 1x1 m i grundfladen og der skal være vågelys så fuglene kan orientere sig ved forstyrrelser, så påflyvninger undgås. Udendørs voliere skal naturligvis være delvis overdækket og med læ for siderne. Redeskjul under fyrregrene i et hjørne bagest i volieren.

I udendørs voliere kan man med fordel, plante stedsegrønne buske som fuglene vil kunne søge ly under. Under disse beplantninger kan man så græs og ukrudsfrø, som vagtlerne vil have stor glæde af.

5. Særlige pasningsbehov, herunder særlige krav til temperaturforhold:

Skal have adgang til tørt og frostfrit inderrum i vinterperioden. Gulvfladen kan med fordel dækkes med halm (10 cm) som er et glimrende isoleringslag. Der skal også være sand på bunden under halmen, så de har mulighed for sandbadning også i vintertiden.

6. Stimulering og behov for motion:

Buskvagtler er flokfugle som samlet vil rode rundt i bundmaterialet, som med fordel kan indeholde det daglige tilskud af animalsk foder f.eks. Pinkylaver, Melorme og lign. Fugtig skovbund sætter de meget stor pris på og de kan bruge meget tid på at gennemsnøge det for spiselige microorganismer.

7. Fodring:

Tropeblanding, grov universalfoder, æggefoder, spiret frø, animalsk foder som Pinkylaver, Melorme. Mælkebøtter, Hønsetarm (*Cerastium caespitosum*) og lign. ukrudt. Knuste muslingeskaller og grit bør der altid være rigeligt af på bunden. Rent drikkevand gives hver dag.

8. Sociale behov:

Holdes bedst flokvis og modsat mange andre arter vagtler kan der fint være flere haner i flokken. Dog bør der ikke tilsættes en etableret flok nye haner, uden der også skiftes til andet miljø samtidig hvor den nye flok kan dannes. Der bør altid være en træstamme til rådighed som sangplads, her vil de synge deres kanarielignende triller. Det er både han og hun der synger. Kan fint holdes i voliere sammen med andre fugle da de er meget fredelige i deres adfærd.

9. Formering og yngelpleje:

Reden er blot et skrabet hul, hvor der lægges 5-8 hvide æg. Rugetiden er 21 dage, men som ved andre vagtler kan rugetiden være begyndt, før det sidste æg er lagt og derfor er det ikke sikkert alle æggene klækker samlet. Når den rugende høne/hane går af reden med de først klækkede kyllinger, tager en anden i flokken over og ruger videre. Kyllingerne passes af hele flokken og ikke kun af forældrefuglene.

10. Typiske tegn på sygdom og nedsat trivsel:

Oppustet fjerdragt og utilpashed. Spidsbrystet og snavs ved kloaken.

Øvrige informationer:

Hanen har et sort og hvidstribet bryst. Kyllinger ringmærkes med M- ringe 5mm ca. 18 dage gamle.

Udseende: Se billeder.



< Ørkenbuskvagt >



< Buskvagt >



Udbredelse: Lever i det sydlige Indien i næsten golde klippeegne.

Lovgivning og dokumentation

Disse vagtler er ikke omfattet af krav om CITES certifikat-
Opdrættede fugle kan handles frit inden for EU.

Slutblok

Denne pasningsvejledning er for hold af fugle som familie- eller hobbydyr. Disse fugle kan eventuelt holdes forsvarligt på andre måder end beskrevet i denne vejledning.

Denne pasningsvejledning er lavet af Ingolf Bjørk Andersen, Landsorganisationen Danske Fugleforeninger (ldf-net.dk) med støtte fra Dyrevelfærdspuljen